

Что такое СПИД?



Введение


- Значение
- История возникновения СПИДа
- Способы заражения и особенности заболевания
- Симптомы
- Этапы развития болезни
- Стадии болезни СПИДа
- Основные направления профилактики

СПИД – это синдром приобретённого иммунодефицита.

СПИД - это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

Возбудитель СПИДа

ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. вируса, поражающего иммунную систему.



ЗАПОМНИТЕ!

ВИЧ и СПИД – это
разные, пусть
и взаимосвязанные
явления.

Надо понимать, что
СПИД – это
состояние,
вызываемое **вирусом**
иммунодефицита
человека (ВИЧ)



История возникновения СПИДа

- Родина СПИДа – центральная Африка.
- Носители – местные обезьяны, затем военнослужащие США, которые перенесли СПИД в Америку.
- 80-е годы прошлого века – широкое распространение «Чумы XX века».
- Через несколько лет болезнь поразила страны Западной Европы.
- Первые описания болезни – США (1981г).



Способы заражения

Заражение СПИДом возможно лишь при попадании ВИЧ в кровь человека.

- При внутривенном употреблении наркотиков с использованием общего шприца.
- При половой связи.
- При переливаниях крови.
- При использовании загрязнённых вирусом медицинских инструментов.
- При пересадке органов и тканей от больных СПИДом.

Особенности заболевания

Больной СПИДом теряет устойчивость к инфекционным заболеваниям, которые для людей с нормальной иммунной системой угрозы не представляют, пневмонии, грибковым заболеваниям и т.п., а также к раку.

Влияние наркотиков на организм подростков

Наркомания ведёт к крайнему истощению организма, значительной потере массы тела и упадку физических сил. Отравление организма становится причиной поражения внутренних органов, особенно печени и почек. Самая распространённая болезнь среди наркоманов – гепатит и СПИД. Эти болезни передаются через кровь, а наркоманы, которые внутривенно, постоянно колются одним шприцом.

ВИЧ при **наркомании** вытекает из множества причин. **Наркомания**, как отдельная болезнь очень серьёзная проблема. А наркомания и ВИЧ – это двойная опасность.



ЗАПОМНИТЕ!

СПИД НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ



ЧЕРЕЗ СТОЛОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ОБЩИМ ТУАЛЕТОМ



ПРИ СОВМЕСТНОМ
КУПАНИИ В БАССЕЙНЕ

БЕЗОПАСНО:

ДОНОРСТВО,

ПОСЕЩЕНИЕ
ПОЛИКЛИНИК,
БОЛЬНИЦ

ПРИ РУКОПОЖАТИИ
ПРИ ПОЦЕЛУЕ



ЧЕРЕЗ СЛЕЗЫ,
СЛЮНУ И ПРИ
ЧИХАНИИ И КАШЛЕ


ЧЕРЕЗ УКУСЫ
НАСЕКОМЫХ

ЧЕРЕЗ УКУСЫ
ЖИВОТНЫХ



Симптомы

- быстрая утомляемость,
- ночная потливость,
- быстрая потеря веса,
- диарея,
- упорный кашель,
- снижение зрительной функции.



Этапы развития болезни



Развитие заболевания СПИДом имеет несколько стадий

- Первая стадия заболевания называется острой.
- После острой стадии наступает бессимптомная, или хроническая стадия.
- После наступает ранняя симптоматическая стадия может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет.
- И последняя называется поздняя симптоматическая стадия.

Основные направления профилактики

- Вести здоровый образ жизни.
- Не употреблять наркотики.
- Соблюдение правил личной гигиены.
- Обеспечение правил обращения со шприцом.
- Стерилизация медицинских инструментов и систем переливания крови.
- Использование одноразовых инструментов.
- Отказ от использования наркотиков.

Лечение

Пока не существует стопроцентно эффективной вакцины или лекарства против СПИДа, так как большинство лекарственных препаратов вызывает сильные побочные действия и не очень эффективны.

1 декабря

**– день
борьбы
со
СПИДом.**

